Síndrome de Horner congénito con heterocromía de iris

Congenital Horner's syndrome with iris heterochromia

Mercedes Molero-Senosaiain*, Liseth Salazar-Quñones, Irene Camacho-Bosca, Álvaro Corrales-Benítez y Enrique Santos-Bueso

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Figura 1. **A:** anisocoria con la pupila izquierda más miótica y el párpado superior izquierdo ptósico, al ser explorada en condiciones escotópicas. **B:** tras la administración de apraclonidina hidrocloreto (Iopimax®), la anisocoria persiste, pero se ha invertido al igual que la ptosis, y ahora la pupila izquierda es la más midriática. **C,D:** heterocromía iridiana en lámpara de hendidura. **E:** múltiples cortes de imagen de resonancia nuclear magnética.

Mujer de 20 años que fue remitida a neurooftalmología por anisocoria y heterocromía de iris. Se le diagnosticó síndrome de Horner izquierdo por malformación vascular a nivel del plexo carotídeo mediante angiorresonancia magnética nuclear (angio-RMN).

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflicto de intereses.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han

realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía

1. Pardal Souto MJ, Alas Barbeito AB, Taboada Perianes M. Congenital Horner's syndrome. *An Pediatr (Barc)*. 2015;82(5):e213-4.
2. Renard D, Jeanjean L, Labauge P. Heterochromia Iridis in congenital Horner's syndrome. *Eur Neurol*. 2010;63(4):253.

Correspondencia:

*Mercedes Molero-Senosaiain
Profesor Martín Lagos, 2
C.P. 28040, Madrid, España
E-mail: merce.molero@gmail.com

Fecha de recepción: 10-12-2018
Fecha de aceptación: 13-01-2019
DOI: 10.24875/RMO.M19000077

Disponible en internet: 03-07-2019
Rev Mex Oftalmol. 2019;93(6):312
www.rmo.com.mx

0187-4519/© 2019 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer México. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).